

# Catálogo de produtos Ourofino

Animais de Companhia

## Linha de antimicrobianos



### Azicox-2

Cartucho: 1 blíster com 6 comprimidos

Antibiótico bactericida e anti-inflamatório não esteroide à base de Azitromicina e Meloxicam. Indicado no tratamento de afecções respiratórias, de pele e anexos, em doenças urogenitais e digestivas, no pós-operatório e em traumatismos em geral de cães e gatos.



### Doxifin Tabs

50 mg e 100 mg - Cartucho: 1 blíster com 14 comprimidos. Display: 10 blísteres com 14 comprimidos  
200 mg - Cartucho: 2 blísteres com 6 comprimidos. Display: 10 blísteres com 6 comprimidos

Antibiótico bacteriostático palatável à base de Doxiciclina. Indicado para o tratamento da erliquiose canina e de infecções dos tratos respiratório, gastrointestinal e geniturinário, bem como da pele e anexos.



### Trissulfin SID

400 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 comprimidos. Display: 10 blísteres com 10 comprimidos  
1600 mg - Cartucho: 2 blísteres com 5 comprimidos. Display: 7 blísteres com 5 comprimidos

Antibiótico bactericida à base de Sulfadimetoxina e Ormetoprim. Indicado no tratamento da isosporose e de diarreias bacterianas, piodermites, infecções urinárias, otites e infecções respiratórias.



### Celesporin

150 mg - Cartucho: 1 blíster com 12 comprimidos. Display: 10 blísteres com 12 comprimidos  
600 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 comprimidos. Display: 10 blísteres com 10 comprimidos

Antibiótico bactericida à base de Cefalexina. Indicado no tratamento de infecções dermatológicas, respiratórias, cistites e nefrites. Além de recomendação para uso pré e pós-operatório de cirurgias eletivas, ortopédicas, entre outras.



### Enrotrat Tabs

25 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 comprimidos. Display: 15 blísteres com 10 comprimidos  
100 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 comprimidos. Display: 10 blísteres com 10 comprimidos  
200 mg - Cartucho: 2 blísteres com 5 comprimidos. Display: 8 blísteres com 5 comprimidos

Antibiótico bactericida palatável à base de Enrofloxacin. Indicado para o tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis à Enrofloxacin.

## Linha de analgésicos



### Beniv

1 frasco com 5 mL  
Medicamento com venda controlada (SIPEAGRO)

Analgésico opioide injetável à base de Buprenorfina (Cloridrato). Indicado para analgesia pós-operatória em cães e gatos.



### Nulli

Frasco com 10 mL acompanhado de seringa dosadora de 1 mL  
Medicamento controlado com retenção obrigatória da notificação de receita (SIPEAGRO)

Analgésico opioide oral à base de Tramadol. Indicado para utilização na clínica e em cirurgias de cães e gatos.

## Linha de anti-inflamatórios



### Maxicam Plus

0,5 mg e 2,0 mg - Cartucho: 1 blíster com 8 comprimidos. Display: 10 blísteres com 8 comprimidos

Anti-inflamatório não esteroide à base de Meloxicam, associado ao condroprotetor Sulfato de Condroitina A. Indicado para o tratamento de processos inflamatórios e dolorosos em geral, problemas osteoarticulares, musculoesqueléticas e no pós-operatório.

### Maxicam

Maxicam 0,2% Solução Injetável

Maxicam Solução Oral

0,5 mg e 2,0 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 comprimidos. Display: 15 blísteres com 10 comprimidos.  
Solução Injetável 0,2% - Frasco-ampola com 20 mL.  
Solução Oral - Frasco com 15 mL acompanhado de seringa dosadora de 1 mL.

Anti-inflamatórios não esteroides à base de Meloxicam. Indicados no tratamento de processos inflamatórios e dolorosos em geral, em traumatismos e no pré e pós-operatório.



### Prediderm Comprimidos

5 mg e 20 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 comprimidos. Display: 15 blísteres com 10 comprimidos

Anti-inflamatório esteroide à base de Prednisolona. Indicado nos processos inflamatórios e alérgicos.

## Linha de dermatológicos



### Bris Shampoo Equilíbrio Pele Seca

Frascos de 200 mL e 500 mL

Apresenta em sua formulação componentes selecionados, como a Fitoesfingosina, Aloe Vera, Vitaminas A e E nanoencapsuladas, que associam-se ao Óleo de Girassol nanoencapsulado, a polissacarídeos e tensoativos suaves. Indicado para a higiene suave e delicada dos pelos enquanto hidrata a pele de cães e gatos, podendo ser utilizado para todos os tipos de pele, especialmente para as secas.



### Bris Sérum Equilíbrio Pele Seca

Frasco de 30 mL

Apresenta em sua formulação componentes selecionados, como a Fitoesfingosina, que estão associados às Ceramidas e também aos Ômega derivados de Óleos de Girassol, Macadâmia, Oliva, Gergelim e Óleo de Calêndula Nanoencapsulada. Indicado para a hidratação profunda da pele, podendo ser utilizado em todos os tipos de pele de cães e gatos, especialmente para as secas e sensíveis.



### Bris Spray Equilíbrio Pele Oleosa

Frasco de 200 mL

Apresenta formulação leve e não oleosa composta por Fitoesfingosina, Ceramidas e Vitamina A nanoencapsulada, associada a uma tecnologia mineral. Indicado para aplicação na pele e pelos de cães e gatos que apresentam maior produção oleosa, sem agredir ou ressecar, renovando e prolongando os efeitos de limpeza, desodorização e hidratação promovidos pelo banho.



### Bris Spray Equilíbrio Pele Seca

Frasco de 200 mL

Apresenta formulação leve e não oleosa composta por Fitoesfingosina e por óleos de Coco, Argan e Abacate nanoencapsulados associado a presença de um complexo vegetal. Indicado para a hidratação intensa dos pelos e da pele seca de cães e gatos, renovando e prolongando os efeitos hidratantes do banho.



### Bris Shampoo Equilíbrio Pele Oleosa

Frasco de 200 mL

Apresenta em sua formulação componentes selecionados, como a Fitoesfingosina, Vitamina A nanoencapsulada, Óleos de Coco, Argan e Abacate nanoencapsulados associam-se a uma tecnologia mineral e a tensoativos suaves. Indicado para a higiene profunda e delicada dos pelos e da pele enquanto desodoriza e hidrata a pele de cães e gatos que apresentam maior produção oleosa, sem agredir ou ressecar.



### Dermotrat Aerosol e Creme

Aerosol - Frasco aerosol de 110 mL  
Creme - Bisnaga de 20 g

Dermatológico à base de Gentamicina, Betametasona e Miconazol. Indicado nas afecções cutâneas bacterianas e/ou fúngicas.



### Regepil

Frasco de 50 ml acompanhado de válvula spray

Cicatrizante composto pela exclusiva associação de Tartarato de Ketanserina e Asiaticosídeo. Indicado para estimular a cicatrização de feridas em cães e gatos, promovendo um resultado mais rápido e de melhor qualidade.



### Auritop

Bisnaga de 15 g com bico aplicador

Otológico à base de Ciprofloxacina, Cetoconazol, Fluocinolona e Lidocaína. Ideal para o tratamento de otites crônicas causadas por fungos e/ou bactérias em cães e gatos.

## Pet Care

Agite bem antes de usar



### EnziClim

Frascos de 220 mL e 480 mL

EnziClim é uma solução com microrganismos vivos que atua de forma natural contra odores e manchas causados por resíduos orgânicos de pets como urina, fezes, vômito e outros em superfícies diversas.

## Linha de otológicos



### Aurigen

Bisnaga de 15 g com bico aplicador

Otológico à base de Gentamicina, Betametasona e Miconazol. Indicado nas otites bacterianas e/ou fúngicas de cães.



### Limp & Hidrat

Frasco de 100 mL com bico aplicador

Solução de limpeza de ouvidos à base de extratos de aloe vera e tilia, saponinas vegetais e óleo essencial de lavanda.

Bactericida  
Fungicida  
Viricida  
Giardicida



### Herbalvet T.A.

Frasco contendo 1 L

Poderoso desinfetante à base de Cloreto de Benzalcônio 15%. Excelente desodorizante com tensoativo biodegradável para a limpeza e desinfecção de ambientes, equipamentos e materiais cirúrgicos veterinários. Rendimento de até 1000 litros na sua indicação viricida (cinomose), até 700 litros na sua indicação giardicida e até 500 litros para sua indicação fungicida e bactericida.

## Linha de suplementos



### Biocanis

Seringa de 14 g

Probiótico palatável à base de bactérias que equilibram a microflora intestinal dos animais.



### Energy Pet

Frasco de 125 mL com seringa dosadora e acoplador

Suplemento à base de vitaminas, aminoácidos e do mineral cromo quelatado, com um agradável aroma de morango. Destinado a melhorar o metabolismo energético de cães, gatos, aves e roedores.



### Longil Snacks

Frasco com 30 tabletes mastigáveis

Suplemento alimentar que auxilia na melhora nutricional e qualidade de vida de cães idosos com idade acima de 7 anos.



### Metacell Pet

Frasco de 50 mL com seringa dosadora e acoplador

Suplemento vitamínico mineral para a suplementação de nutrientes que auxiliam animais em estados de convalescência, gestação e lactação. Recomendado também na performance de animais atletas.



### Condromax Pet Tabletes Palatáveis

Cartucho: 1 blister com 30 tabletes palatáveis.  
Cartucho: 3 blisters com 30 tabletes palatáveis

Suplemento palatável à base de Sulfato de Condroitina, Glicosamina e dos minerais cobre, zinco e manganês quelatados.



### Ativi 40 mg

Cartucho: 1 blister com 30 comprimidos palatáveis

Suplemento alimentar palatável a base de colágeno tipo II não desnaturado (UC-II®) de fabricação patenteada, associado aos minerais cobre, zinco, manganês e selênio, componentes que exercem suporte nutricional ao metabolismo da construção de estruturas articulares.



### Metacell Snacks

Frasco com 30 tabletes mastigáveis

Suplemento vitamínico mineral para a suplementação de nutrientes que auxiliam animais em estados de convalescência, gestação e lactação. Recomendado também na performance de animais atletas.



### Rennaiz Snacks

Frasco com 30 tabletes mastigáveis

Suplemento alimentar indicado para equilibrar os líquidos e minerais do pet, melhora nutricional e qualidade de vida de animais em todas as fases de vida em situações que se beneficiem do aporte de seus nutrientes.



### Kardio Snacks

Frasco com 30 tabletes mastigáveis

Suplemento alimentar que auxilia no suprimento da demanda de cães de todas as idades e fases da vida que se beneficiam do aporte nutricional destes nutrientes.



### Imunees Ourofino Snacks

Frasco com 30 tabletes mastigáveis

Suplemento alimentar indicado no auxílio do sistema imunológico de cães em todas as fases da vida.



### Plenipil Snacks

Snack: Frasco com 30 tabletes mastigáveis

Suplemento alimentar que auxilia no fortalecimento e manutenção da estrutura e função da pele e pelos dos animais de todas as idades e fases da vida que necessitem do aporte desses nutrientes.



### Uree Snacks

Frasco com 30 tabletes mastigáveis

Suplemento alimentar indicado para auxiliar as funções essenciais, melhora nutricional e qualidade de vida de animais em todas as fases de vida em situações que se beneficiem do aporte de seus nutrientes.



## Linha de suplementos



**Seren**  
Seringa de 30 g



**Seren Snacks:**  
Frasco com 30 tabletes mastigáveis



Suplemento alimentar indicado no suporte nutricional para todas as idades e fases da vida dos animais que necessitem do aporte desses nutrientes auxiliando, inclusive, em situações de estresse.



**Banni 3**



Cartucho: 1 Pipeta  
Combo: 3 Pipetas

Endectocida de uso tópico à base de Praziquantel, Moxidectina e Fipronil. Indicado para a proteção contra vermes redondos e chatos, piolhos, sarnas e pulgas.



**Leevre**



48 cm - 1 coleira para cães de pequeno a médio porte  
63 cm - 1 coleira para cães de grande porte  
Display expositor: 6 latas

Coleira ectoparasiticida à base de Deltametrina e Propoxur. Auxilia na repelência e mortalidade do vetor da Leishmaniose Visceral e no controle das infestações de carrapatos e pulgas em cães.

## Linha de antiparasitários



**Banni**



Cartucho: 1 Pipeta

Endectocida de uso tópico à base de Moxidectina e Fipronil. Indicado para proteção contra vermes redondos, pulgas e carrapatos.



**NEOPet**



Cartucho: 1 Pipeta  
Combo: 3 Pipetas

Ectoparasiticida de uso tópico à base de Fipronil a 12,5%. Indicado para o combate e o controle de carrapatos em cães e pulgas em cães e gatos.



**Top Dog**



2,5 kg e 10 kg - Cartucho: 1 blister com 4 comprimidos. Display expositor: 12 cartuchos  
30 kg - Cartucho: 1 blister com 2 comprimidos. Display expositor: 12 cartuchos

Vermífugo palatável à base de Praziquantel, Pamoato de Pirantel, Febantel e Ivermectina. Indicado para o combate a vermes chatos e redondos e para o tratamento de giardíase em cães.

## Kit Diagnóstico



**Conclue Cinomose**

Display contendo 10 kits

Detecta o agente causador (antígeno) da Cinomose Canina em amostra de swab de secreção ocular (conjuntiva) ou descarga nasal de cães.



**Conclue Dirofilariose**

Display contendo 10 kits

Detecção do agente causador (antígeno) da Dirofilariose Canina, em amostra de sangue total, soro ou plasma de cães.



**Conclue FeLV**

Display contendo 10 kits

Detecção do agente causador (antígeno) da Leucemia Felina, em amostra de sangue total, soro ou plasma de gatos.



**Conclue Eriquiiose**

Display contendo 10 kits

Detecção de anticorpos contra o agente causador da Eriquiiose (*Ehrlichia canis*), em amostra de sangue total, soro ou plasma de cães.



**Conclue Panleucopenia**

Display contendo 10 kits

Detecção do agente causador (antígeno) da Panleucopenia Felina, em amostra de fezes de gatos.



**Conclue Giardíase**

Display contendo 10 kits

Detecção do agente causador (antígeno) da Giardíase canina e felina (*Giardia lamblia*), em amostra de fezes de cães e gatos.



# TABELA DE DOSES

## Antimicrobianos

### Azicox-2 (Azitromicina/Meloxicam)

**50 mg** | 1º dia: 2 comp./5 kg SID  
2º dia: 1 comp./5 kg SID

**200 mg** | 1º dia: 2 comp./20 kg SID  
2º dia: 1 comp./20 kg SID  
Tempo total de tratamento de 3 a 5 dias.

### Celesporin (Cefalexina)

**150 mg** | 1 comp./5 kg BID → 7 dias  
**600 mg** | 1 comp./20 kg BID → 7 dias

### Doxifin Tabs (Doxiciclina)

**50 mg** | 1 comp./5 kg SID → 7 dias  
Erliquiose: mínimo 28 dias

**100 mg** | 1 comp./10 kg SID → 7 dias  
Erliquiose: mínimo 28 dias

**200 mg** | 1 comp./20 kg SID → 7 dias  
Erliquiose: mínimo 28 dias

### Enrotrat Tabs (Enrofloxacin)

**25 mg** | 1 comp./5 kg SID → 3 a 5 dias  
**100 mg** | 1 comp./20 kg SID → 3 a 5 dias  
**200 mg** | 1 comp./40 kg SID → 3 a 5 dias

### Trissulfim SID (Sulfadimetoxina/Ormetoprim)

**400 mg** | 1º dia: 2 comp./5 kg SID  
2º dia: 1 comp./5 kg SID → 3 a 21 dias  
Isosporose canina: 1 comp./2 kg SID → 5 a 14 dias

**1600 mg** | 1º dia: 2 comp./20 kg SID  
2º dia: 1 comp./20 kg SID → 3 a 21 dias  
Isosporose canina: 1 comp./8 kg SID → 5 a 14 dias

## Analgésicos

### Beniv (Buprenorfina)

Medicamento com venda controlada (SIPEAGRO)  
**0,05 mL** | Kg/ TID por até 3 dias ou a critério do M.V.

### Nulli (Tramadol 40 mg/mL)

Medicamento controlado com retenção obrigatória da notificação de receita (SIPEAGRO).  
**0,05 a 0,1 mL** | kg/ TID  
Duração do tratamento a critério do M.V.

## Anti-Inflamatórios

### Maxicam (Meloxicam)

**Cães: 0,5 mg** | 1º dia: 2 comp./5 kg SID  
2º dia: 1 comp./5 kg SID → 5 a 7 dias

**2,0 mg** | 1º dia: 2 comp./20 kg SID  
2º dia: 1 comp./20 kg SID → 5 a 7 dias  
Até 28 dias: quadros crônicos.

**Gatos: 0,5 mg** | 1 comp./5 kg → até 4 dias

### Maxicam 0,2% Solução Injetável (Meloxicam)

**Cães** | 1º dia: 1 mL/10 kg SID IV/SC/IM  
2º dia: 0,5 mL/10 kg SID. Por até mais 5 dias ou a critério do M.V.

**Gatos** | Dose única: 0,1 mL/1 kg/ SC

### Maxicam Solução Oral (Meloxicam 0,1%)

**Cães adultos** | 1º dia: 0,2ml/kg SID  
Até 35 dias  
2º dia: 0,1ml/kg SID – uso mínimo 4 dias

**Gatos adultos** | 1º dia: 0,1ml/kg SID  
Até 21 dias  
2º dia: 0,05ml/kg SID – uso mínimo 4 dias

Cães e gatos filhotes: até 7 dias.

### Maxicam Plus (Meloxicam/Sulfato de Condroitina A)

**Cães: 0,5 mg** | 1º dia: 2 comp./5 kg SID  
2º dia: 1 comp./5 kg SID → 5 a 7 dias

**2,0 mg** | 1º dia: 2 comp./20 kg SID  
2º dia: 1 comp./20 kg SID → 5 a 7 dias  
Até 28 dias: quadros crônicos.

**Gatos: 0,5 mg** | 1 comp./5 kg → até 4 dias

### Prediderm Comprimidos (Prednisolona)

**5 mg** | 1 comp./5 a 10 kg SID ou BID  
**20 mg** | 1 comp./20 a 40 kg SID ou BID

## Suplementos

### Ativi 40 mg (Colágeno Tipo II não desnaturado (UC-II®)/cobre/zinco/manganês e selênio)

1 comp./ independente do peso corporal do animal SID → durante no mínimo 60 dias  
Recomenda-se que a administração ocorra 1 hora antes da alimentação do animal.

 e UC-II® são marcas registradas da Lonz ou de suas afiliadas.

### Biocanis (Lactobacillus acidophilus/Bifidobacterium animalis subs. lactis/Enterococcus faecium)

**Recém-nascidos** - 2 g → a cada 6 ou 12 horas  
**Adultos** - 4 g → a cada 6 ou 12 horas  
**Partos** - 4 g → a cada 6 ou 12 horas

### Condromax Pet (Sulfato de Condroitina/Glicosamina/Cobre, zinco e manganês quelatos)

**Até 10 kg** - ½ tablete - SID → durante 30 dias  
**11 a 20 kg** - 1 tablete - SID → durante 30 dias  
**21 a 30 kg** - 2 tabletes - SID → durante 30 dias  
**Acima de 31 kg** - 3 tabletes - SID → durante 30 dias

### Energy Pet (Suplemento vitamínico aminoácido/vitaminas do complexo B, C, aminoácidos, glicose e cromo quelato)

**Cães e gatos** | 0,5 mL/kg BID → 15 a 30 dias  
**Aves e roedores** | 1 mL diluído em 100 mL de água BID → 15 a 30 dias

### Imunees Ourofino Snacks (Aminoácidos, Vitamina C e Vitamina D3, Betagluconas e MOS)

1 tablete/10 kg - SID

### Kardio Snacks (Coenzima Q10, astaxantina, aminoácidos, vitaminas e ômega 3)

1 g/5 kg - SID

### Longil Snacks (Vitaminas, biotina, minerais, aminoácidos, colágeno, B. bifidum e MOS)

1 tablete/10 kg - SID

### Metacell Pet (Ácido fólico, vitaminas B2, B6, B12, C, K3, cobalto, cobre, ferro, zinco, açúcar frutose e sorbitol)

**Cães e gatos** | 1 mL/10 kg BID → 15 a 30 dias  
**Aves e roedores** | 2 mL diluídos em 1 litro de água → 15 a 30 dias

### Metacell Snacks (Ácido fólico, vitaminas B2, B6, B12, C, K3, cobalto, cobre, ferro, zinco, açúcar frutose e sorbitol)

**Cães e gatos** | 1 mL/10 kg BID → 15 a 30 dias  
**Aves e roedores** | 2 mL diluídos em 1 litro de água → 15 a 30 dias

### Plenipil Snacks (Ômega 3, vitamina A, biotina e selênio)

1 tablete/10 kg - SID

### Rennaiz Snacks (Vitaminas do Complexo B, Ômega 3, Quitosana, Betacarotenos, Probióticos e Vitaminas C e E)

1 tablete/10 kg - SID

### Seren (L-Triptofano, associado à vitamina B6, Magnésio Aminoácido Quelato e Hidrolisado de Peixes)

1 g /10 kg - SID

### Seren Snacks (Triptofano, magnésio, romã desidratada e extratos de camomila)

1 tablete/10 kg - SID

### Uree Snacks (Arando, Romã, Betagluconas, Ômega 3, Sulfato de Glucosamina e Vitamina A)

1 tablete/10 kg - SID

## Antiparasitários

### Banni 3 (Praziquantel 8,3%, Moxidectina 0,83% e Fipronil 12,5%)

**Gatos** | até 2,5 kg - 0,3 mL  
2,6 kg até 7,5 kg - 0,9 mL

Idade mínima: 1 mês  
Intervalo de tratamento deve seguir orientações de bula e/ou do médico-veterinário.

### Banni (Moxidectina 3%, Fipronil 12,5%)

**Cães** | Até 5 kg - 0,32 ml  
5,1-10 kg - 0,67 ml  
10,1-20 kg - 1,34 ml  
20,1-40 kg - 2,68 ml  
40,1-60 kg - 4,02 ml

Idade mínima: 6 semanas  
Intervalo de tratamento deve seguir orientações de bula e/ou do médico-veterinário

### Leevre (Deltametrina 4%/Propoxur 12%)

**Coleira - 48 cm** | Cães de pequeno a médio porte  
Circunferência máxima: 38 cm

**Coleira - 63 cm** | Cães de grande porte  
Circunferência máxima: 53 cm

Idade mínima: 10 meses. Peso mínimo: 5 kg.  
Sugere-se um intervalo de troca a cada 6 meses no mínimo.

### NEOPet (Fipronil 12,5%)

**Cães** | até 10 kg - 0,67 mL → aplicar a cada 30 dias  
10,1 a 20 kg - 1,34 mL → aplicar a cada 30 dias  
20,1 a 40 kg - 2,68 mL → aplicar a cada 30 dias  
acima de 40 kg - 4,02 mL → aplicar a cada 30 dias

**Gatos** | até 8 kg - 0,32 mL → aplicar a cada 30 dias

### Top Dog (Praziquantel/Pamoato de Pirantel/Febantel/Ivermectina)

**2,5 kg** | 1 comp. p/ cada 2,5 kg  
**10 kg** | 1 comp. p/ cada 10 kg  
**30 kg** | 1 comp. p/ cada 30 kg

Recomenda-se dose de reforço após 15 dias.  
Giardíase: 3 dias consecutivos.

## Dermatológicos

### Bris Shampoo Equilíbrio Pele Seca

(Fitoesfingosina, Aloe Vera, Vitaminas A e E nanoencapsuladas, Óleo de Girassol nanoencapsulado, polissacarídeos e tensoativos)

### Bris Shampoo Equilíbrio Pele Oleosa

(Fitoesfingosina, Vitamina A nanoencapsulada, Óleos de Coco, Argan e Abacate nanoencapsulados, tecnologia mineral e tensoativos)

Aplicar quantidade desejada do produto nos pelo molhados do animal e massagear de forma a produzir espuma e cobrir toda a pele e pelagem. Aguardar por 5 a 10 minutos para proporcionar contato dos ingredientes com a pele e os pelos. Enxaguar abundantemente.  
Uso tópico.

### Bris Spray Equilíbrio Pele Seca

(Fitoesfingosina, Óleos de Coco, Argan e Abacate nanoencapsulados e complexo vegetal)

### Bris Spray Equilíbrio Pele Oleosa

(Fitoesfingosina, Ceramidas e Vitamina A nanoencapsulada e tecnologia mineral)

Pulverizar o produto sobre a pelagem seca, no sentido contrário ao crescimento do pelo, de forma a cobrir com uma névoa do produto todo o corpo do animal. Não necessita enxágue.  
Uso tópico. Agite antes de usar.

### Bris Sérum Equilíbrio Pele Seca

(Fitoesfingosina, Ceramidas, Óleos de Girassol, Macadâmia, Oliva, Gergelim e Óleo de Calêndula Nanoencapsulada)

Afaste os pelos do dorso do animal até a visualização da pele e deposite a quantidade de produto, de acordo com o porte do animal, pressionando a válvula de aplicação até seu limite final.  
Uso tópico.

### Dermotrat (Gentamicina/Betametasona/Miconazol)

**Aerosol** | 7 - 10 dias/Afecções fúngicas → até 4 semanas  
**Creme** | 7 - 10 dias/Afecções fúngicas → até 4 semanas

### Regepil (Tartarato de Ketanserina/Asiaticosídeo)

Aplicar na área da ferida 3 vezes ao dia até completa cicatrização.  
Não aplicar em feridas com sangramento ativo.

## Otológicos

### Aurigen (Gentamicina/Betametasona/Miconazol)

**até 15 kg** - 4 gotas BID → durante 7 a 9 dias  
**acima 15 kg** - 8 gotas BID → durante 7 a 9 dias

### Auritop (Ciprofloxacina/Cetoconazol/Fluocinolona/Lidocaina)

**Cães** | até 15 kg - 4 gotas BID → durante 7 a 10 dias  
acima 15 kg - 8 gotas BID → durante 7 a 10 dias  
**Gatos** | 3 gotas BID → durante 7 a 10 dias

### Limp & Hidrat (Extrato de aloe vera/extrato de tilia/saponinas vegetais/óleo essencial de lavanda)

Recomenda-se a limpeza 1 vez por semana.

## Pet Care

### EnziClim (Microorganismos vivos)

Antes de aplicar o produto teste em uma pequena parte da superfície.

Remova o excesso de resíduos orgânicos sólidos ou líquidos com um pano, agite bem o frasco do produto, borrife o produto no local até cobrir toda a área afetada. Deixe secar naturalmente. Repita a aplicação, se necessário.

### Herbalvet T.A. (Cloreto de Benzalcônio 15%)

**Para inativação de bactérias e fungos:** Diluir 1 mL para 500 mL de água (10 mL para 5 litros de água)

**Para inativação de cistos de Giardia spp.:** Diluir 1 mL para 700 mL de água (10 mL para 7 litros de água)

**Para inativação do vírus da cinomose:** Diluir 1 mL para 1 litro de água (10 mL para 10 litros de água)

Para a desinfecção para mais de uma indicação prevista deve-se considerar a menor diluição dentre as indicações de interesse.

SID = 1 vez ao dia.  
BID = 2 vezes ao dia.  
TID = 3 vezes ao dia.  
Prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário.  
Consulte sempre a bula.

